

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷五十九

詳校官太醫院恩糧臣孔毓秀

編修臣倉聖脉覆勘

總校官進士臣朱

鈐

校對官中書臣吳

俊

謄錄監生

臣王廷樞

欽定四庫全書

證治準繩卷五十九

明 王肯堂 撰

女科

雜症門

中風

藥隱云婦人中風角弓反張風痺手足不隨偏枯口噤
口眼喎斜風眩頭痛血風心神驚悸癲狂骨節風血風

走注瘙痒癰疹風痰諸證雖各有方論亦要先明其大體察脈之虛實辨證之冷熱相人強弱入臟入腑在絡在經首以方調治未要猛速用藥今之治法先宜順氣然後治風萬不失一蓋有中風中寒中暈中痰中氣皆能令人涎潮昏塞所謂朱紫相凌玉石不分醫者不可不詳而究之如中風若作中氣治之十愈八九中氣若作中風治之十無一生所以疑惑之間不問中風中氣首以蘇合香丸五積散加麝煎如中痰則有參蘇飲如

中寒則有理中湯如中暍則有白虎湯如的然是中風
有三生飲木香煮散排風續命風引大小竹瀝大八風
湯辨其冷熱虛實而投之未有不安者也然此疾積襲
之久非一日所能致今人服藥三五服便責無効其責
醫者亦速矣正宜大劑久服方有其効孟子曰七年之
病求三年之艾也 大夫中風者虛風中於人也風是
四時八方之氣常以冬至之日自坎而起候其八方之
風從其鄉來者主長養萬物若不從其鄉來者名為虛

賊風害萬物人體虛者則中之當時雖不即發停在肌膚後或重傷於風前後重昏因體虛則發入臟腑俞俞皆在背中風多在俞入隨所中之俞而乃發病婦人血氣虛損故令中風也當察口眼開闔以別重輕涎沫有無以明證治如眼開口閉手足不開涎不作聲者可治如眼閉口開聲如鼾睡遺尿不覺者死按卒仆暴厥之證不論男子婦人是風是寒是氣是食是痰是濕但要分得閉與脫二證明白如牙關緊閉兩手握固即是

閉證宜蘇合香丸三生飲之類開之若口開手撒即是
脫證宜用大劑黃芪人參煎濃湯灌之雖曰在法不治
亦十救五六若誤服蘇合香丸之類即不可救矣蓋斬
關奪門之藥原為閉證設若施之脫證是人既入井而
又下之石也 薛中風者即內經所謂偏枯風痺風懿
風痺是也而有中腑中臟中血脈之分焉夫中腑者為
在表中臟者為在裏中血脈者為在中在表者宜微汗
在裏者宜微下在中者宜調榮中腑者多著四肢如手

足拘急不仁惡風寒此數者病淺皆易治用加減續命湯之類中臟者多滯九竅如眼瞽者中於肝舌不能言者中於心唇緩便秘者中於脾鼻塞者中於肺耳聾者中於腎此數者病深多難治中血脈者外無六經之證內無便溺之阻肢不能舉口不能言用大秦朮湯主之中腑者多兼中臟如左關脈浮弦面目青左脇偏痛筋脈拘急目瞶頭目眩手足不收坐踞不得此中膽兼中肝也用犀角散之類如左寸脈浮洪面舌赤汗多惡風

心神顛倒言語謇澀舌強口乾忪悸恍惚此中小腸兼
中心也用麻黃散之類如右關脈浮緩或浮大面唇黃
汗多惡風口喎語澀身重怠惰嗜卧肌膚不仁皮肉瞤
動腹膨不食此中胃兼中脾也用防風散之類如右寸
脈浮濇而短面色白鼻流清涕多喘胸中冒悶短氣自
汗聲嘶四肢痿弱此中大腸兼中肺也用五味子湯之
類如左尺脈浮滑面目鰲黑腰脊痛引小腹不能俛仰
兩耳虛鳴骨節疼痛足痿善恐此中膀胱兼中腎也用

獨活散之類此皆言真中風也而有氣血之分焉蓋氣虛而中者由元氣虛而賊風襲之則右手足不仁用六君子湯加釣藤薑汁竹瀝血虛而中者由陰血虛而賊風襲之則左手足不仁用四物湯加釣藤竹瀝薑汁氣血俱虛而中者則左右手足皆不仁也用八珍湯加釣藤薑汁竹瀝其與中風相類者則有中寒中濕中火中氣食厥勞傷房勞等證如中於寒者謂冬月卒中寒氣昏胃口噤肢攣惡寒脈浮緊用麻黃桂枝理中湯之類

中於暑者謂夏月卒冒炎暑昏冒痿厥吐瀉喘滿用十
味香薷飲之類中於濕者丹溪所謂東南之人多因濕
土生痰痰生熱熱生風也用清燥湯之類加竹瀝薑汁
中於火者河間所謂非肝木之風內中六淫之邪外侵
良由五志過極火盛水衰熱氣拂鬱昏冒而卒仆也用
六味九四君子獨參湯之類內有恚怒傷肝火動上炎
者用柴胡湯之類中於氣者由七情過極氣厥昏冒或
牙關緊急用蘇合香丸之類誤作風治者死食厥者過

於飲食胃氣自傷不能運化故昏冒也用六君子加木
香勞傷者過於勞役耗損元氣脾胃虛衰不任風寒故
昏冒也用補中益氣湯房勞者因腎虛精耗氣不歸源
故昏冒也用六味丸此皆類中風者也夫內經主於風
河間主於火東垣主於氣丹溪主於濕愚之斯論僭補
前人之闕也若夫地之南北人之虛實固有不同其男
子女人大略相似當與後論參看通變治之

內方並見
雜病中風

斯閣老夫人先胸脇脹痛後四肢不收自汗如水小便

自遺大便不實口緊目潤飲食頗進十餘日矣或以為
中臟公甚憂余曰非也若風既中臟真氣既脫惡證既
見禍在反掌焉能延之乃候其色面目俱赤面時或青
診其脈左三部洪數惟肝尤甚余曰胸乳脹痛肝經血
虛肝氣痞塞也四肢不收肝經血虛不能養筋也自汗
不止肝經風熱津液妄泄也小便自遺肝經熱甚陰挺
失職也大便不實肝木熾甚剋脾土也遂用犀角散四
劑諸證頓愈又用加味逍遙散調理而安後因鬱怒前

證復作兼發熱嘔吐飲食少思月經不止此木盛尅土而脾不能攝血也用加味歸脾湯為主佐以加味逍遙散調補肝脾之氣清和脾肝之血而愈後每遇怒或睡中手足抽搐復用前藥即愈 大叅朱雲溪母於九月內忽仆地痰昧不省人事唇口喎斜左目緊小或用痰血之劑其勢稍緩至次年四月初其病復作仍進前藥執亦漸緩至六月終病乃大作小便自遺或謂風中於臟以為不治余診之左關弦洪而數此屬肝火血燥也

遂用六味丸加五味子麥門芎歸一劑而飲食頓進小
便頓調隨用補中益氣加茯苓山梔釣藤丹皮而安至
十月復以傷食腹痛作瀉左目仍小兩關尺脈弦洪鼓
指余以六君加木香吳茱升麻柴胡一劑而痛瀉俱緩
復以六君加肉果故紙一劑諸脈頓平痛瀉俱止余謂
左關弦洪由肝火血燥故左目緊小右關弦洪由肝邪
乘脾故唇口喎邪腹痛作瀉二尺鼓指由元氣下陷設
以目緊口喎誤作風中投以風藥以腹痛泄瀉誤作積

滯投以峻劑復耗元氣為害甚矣後以陽虛惡寒圍火
過熱致痰喘誤服寒劑而卒 一婦人因怒仆地語言
謇澁口眼喎斜四肢拘急汗出遺尿六脈洪大肝脈尤
甚皆由肝火熾甚蓋肝主小便因熱甚而自遺也用加
味逍遙散加釣藤及六味丸尋愈 一老婦兩臂不遂
語言謇澁服祛風之藥反致筋攣骨痛余謂此肝火血
虛所致用八珍湯補氣血用地黃丸補腎水佐以排風
湯年餘而愈 一婦人經行口眼歪斜痰涎壅盛此血

虛而肝火動用加味逍遙散加丹皮治之尋愈後因飲食停滯日吐痰涎此脾氣虛不能攝涎歸經也用六君子二十餘劑而安 一婦人因怒口眼喎斜痰涎上涌口噤發搐此脾肺氣虛而肝木旺用六君子加木香釣藤柴胡治之漸愈又用加味歸脾湯調理而安 一產婦勤於女工忽仆地牙關緊急痰喘氣粗四肢不遂此氣血虛而發痙朝用補中益氣加茯苓半夏夕用八珍加半夏各三十餘劑不應此氣血之未服藥之未及也

仍用前二湯又五十餘劑尋愈 一婦人素性急患肝風之證常服搜風順氣丸秦朮湯之類後因大怒吐血唇口牽緊小便頻數或時自遺余以為肝火旺而血妄行遂用小柴胡湯加山梔牡丹皮漸愈五年之後又大怒吐血誤服降火祛風化痰之劑大便秘數胸滿少食用清氣化痰之劑嘔而不食頭暈口乾不時吐痰用導痰降火之類痰出如涌四肢常冷余曰嘔而不食胃氣虛弱也頭暈口乾中氣不能上升也痰出如涌脾氣不

能攝涎也四肢逆冷脾氣不能運行也用補中益氣加茯苓半夏治之諸症漸愈又用加味歸脾湯兼服而安

陳癸丑春有一婦人年四十二三其證語言氣短足弱行得數步則口若含霜七十日內三次經行則口冷頭目眩暈足冷則透心冷痛每行則口中冷氣不相續有時鼻中熱面赤翕然而熱身體不仁不能行步手足不隨不能俛仰冷痺骨痛有時悲傷夢與前夫相隨則上氣奄然而極心驚志意不定恍惚多忘却能食如此

僅一年許醫者投熱藥則面翕然而熱氣滿胸中咽中窒塞悶絕投冷藥則瀉又一醫者以十全湯服之則發煩躁心驚而跳一醫以雙和湯服之覺面上與腹中如火燂心愈驚欲吐不吐大便秘裏急後重求僕診之六脈弦緩喜見於春此是可治之疾未供藥間忽然吐瀉瀉後覺肛門如火雖瀉却不多僕且與俞山人降氣湯八服次日診之脈差有力云服藥後覺鼻熱心煩悶齒噤與參蘇飲八服黃連九一兩越三日云服藥後如故

與茯苓補心湯服皆無効僕以脈證詳之只是排風湯
甚對或曰何以知之一能食飲此風飢也二七十日三
次經行此是榮經有風血得風散也三頭目眩暈此肝
風也四面赤翕然而熱悲傷此心風也五身體不仁不
能行步夢與前夫相隨此脾風也六手足不隨腰痛難
俛仰冷痺骨疼此腎風也因令人心驚恍惚多忘真排
風湯證也或曰風脈當浮今脈弦緩微弱恐非風也予
曰風無一定之脈大抵此證虛腎生風然排風湯藥品

有十全大補湯料亦有平補之資却不僭燥供十服越三日云服有效脈亦差勝只是腹中如烟生微熱大便秘此真是風症再與排風湯服加牛黃清心丸皂角丸助之越三日云服前藥大煩躁發熱諸證悉除只是足弱不能支時與秘傳降氣湯十服諸證悉退只是夢裏虛驚大便滑泄頻數脈尚弱與五積散加人參鹽煎兼感應丸即愈但頭眩痛重不能久立久坐再與排風湯脫然而安矣 繆安人年六十忽中風不省人事無汗

有痰衆醫為不可治召僕診之脈浮緩脾脈溢關此真風脈先以參蘇飲六服寬氣下痰次以木香煮散而愈馬觀文夫人於七月間病氣弱倦怠四肢厥逆惡寒有汗少飲食一醫謂伏暑一醫謂虛寒治皆無效召僕診之六脈雖弱而兩關差甚焉問是何證僕曰六脈雖弱而關獨甚此中焦寒也中焦脾也脾胃既寒不但有此證必有腹痛吐瀉今四肢厥冷脾屬四肢是脾胃虛冷無疑焉曰未見腹痛吐瀉之證合用何治僕曰宜附

子理中湯未服藥間旋即腹痛而瀉莫不神之即投此藥而瘥

防風散 治婦人中風言語謇澁四肢拘急身體壯熱

頭疼目眩心胸不利 防風去蘆一兩石膏二兩麻黃去節

漢防已去皮各七錢半細辛去苗黃芩 川升麻 當歸去蘆

桂心 芍藥 赤茯苓去皮甘草炙羌活去蘆各半兩

右為粗散每服八錢水一中盞半煎至一大盞去滓

入淡竹瀝一合更煎一兩沸溫服不拘時

芎藭散

治婦人卒中風四肢不仁善笑不息 芎藭

一兩半

石膏

二兩半

當歸

去蘆炒

麻黃

去節

秦艽

去蘆

薑

桂心

各一兩

杏仁

二十枚 炒

黃芩

一兩

研為粗末每服

八錢水一中盞半煎至一大盞去滓溫服不拘時候

日進二三服

附子散

治婦人中風筋脈拘急四肢疼痛言語蹇澀

心胸不利

附子

炮去皮臍

細辛

各七錢半

當歸

去蘆炒

芎藭

前胡

去蘆

枳殼

麩炒去瓢

黃芩

白蘚皮

茯神

去木

羌活

去蘆

杏仁

炒

漢防已

去皮

甘草

炙

麻黃

去節

桂心

各一兩

右為粗末每服五錢水一中盞半生薑五片煎至一

大盞去滓不拘時服

羌活散

治婦人中風筋脈拘急肢節痠疼言語蹇澀

頭目不利

羌活

去蘆

天麻

各一兩

芎藭

酸棗仁

各七錢半

微炒

蔓荊子

白附子

炮

栝子仁

牛膝

酒浸

桂心

薏苡仁

當歸

去蘆

麝羊角

屑

烏蛇肉

酒拌炒

蟬

殼

炒各半兩

麝香

另研一錢半

研為細末入研麝香勻

每服一錢荳淋酒調下無時

南星散 治婦人中風牙關緊急四肢強直心胸痰涎

咽膈不利

天南星

生薑製

麻黃

半夏

湯洗七次薑製

赤箭

各半兩

川烏頭

炮去皮臍

桂心

蝎稍

各二錢半生用

麝香

半錢研

右為細末入研麝香令勻每服一錢荳淋酒調下日

進二服不拘時候

木香煮散

治左癱右瘓并素有風濕諸藥不効常服

調氣進食寬中

羌活

麻黃

去節各一兩

防風

七錢半

白

朮 陳皮 黑附子炮 楠木香 檳榔 牛膝

大川烏炮 草豆蔻連皮 杏仁去皮 人參 白茯苓

煨 麩炒

川芎 當歸 甘草 桂心各半 為咬咀每

兩

服四錢水一大盞半生薑五片煎至八分去滓熱服
大便不通加大黃心腹脹加苦葶藶滑石膈上壅滯
咳嗽氣促加半夏川升麻天門冬知母 此古方專
主婦人中風故收之率用麻黃桂心非真中外邪不
宜輕用以薛氏法調之為善其餘證治方藥詳見雜

病本門男婦初無二治也

角弓反張大夫婦人角弓反張者是體虛受風風入諸陽之經人之陰陽經絡周環於身風乘虛入於諸陽之經則腰背反折攣急如角弓之狀宜服小續命湯 薛仲景先生云太陽病發汗太多致瘕風病下之則瘕三因方云氣血內虛風寒濕熱所中則瘕以風能散氣故有汗而不惡寒曰柔瘕寒能澀血故無汗而惡寒曰剛瘕非專於風濕因內虛發汗亡血筋無所榮而然乃虛象也竊謂傷寒汗

下過度與產婦潰瘍等病及因尅伐之劑傷損氣血

而變若金衰木旺先用瀉青丸

幼科肝臟

後用異功散

幼科吐瀉

腎水虛用六味丸

雜病虛勞

肝火旺先用加味小柴胡湯

熱入

血室次用加味四物湯發熱用加味逍遙散若木侮脾土

用補中益氣湯

雜病傷勞倦

加芍藥山梔脾經鬱結用加味

歸脾湯

雜病健忘

脾土濕熱用大承氣湯

傷寒胃實

大凡病後氣

血虛弱用參朮濃煎佐以薑汁竹瀝時時用之如不應

用十全大補湯

雜病虛勞

更不應加附子或用參附湯緩則

不救

人參一兩附子二錢水煎服

白僵蠶散

治婦人中風角弓反張口噤不能言皮

膚頑麻筋脈抽掣

白殭蠶

一兩炒

麝香

二錢半另研

烏蛇

肉

炒令黃

蟬殼

炒

桑螵蛸

炒

犀角屑

天麻

獨活

去蘆

天南星

炮

川烏頭

炮去皮臍

白附子

炮

硃砂

另研水飛

防風

去蘆各半兩

研為細末入研藥令勻每服二錢

溫酒調下不拘時日三服

羚羊角散

治婦人中風角弓反張筋脈拘急言語蹇

澀心神煩悶

羚羊角

屑

鹿角膠

搗碎炒
令黃燥

赤箭

酸

棗仁

炒

薏苡仁

各一兩

白附子

炮

芎藭

當歸

炒去
蘆

人參

去蘆各
七錢半

羌活

去
蘆

白鮮皮

地骨皮

柏子仁

蔓荊子

犀角屑

各半兩

牛黃

另
研

麝香

各二錢半
另研

右為細末入研藥令勻每服一錢煎薄荷湯調下日

進三服無時

紫湯

治婦人中風腰脊反張如弓之狀

雞糞白

一合炒
微黃

大荳

二合
炒熟

防風

一兩
去蘆

研為麤末

每服五錢酒水各一中盞煎至六分去滓溫服不拘時候

烏蛇丸 治婦人中風角弓反張或身體強直牙關緊

急 烏蛇肉酒浸 犀角屑 白附子炮 天麻各一兩 半夏

湯洗七遍 生薑製 天南星炮 麻黃去節 桂心 獨活去蘆 白殭

蠶炒 晚蠶沙炒 乾蝎微炒各半兩 麝香二錢半另細 研為

細末入研麝令勻煉蜜和搗二三百下丸如梧桐子大每服三十九豆淋酒送下日二服無時

餘並詳雜病瘕門

口噤夫婦人中風口噤者是體虛受風風入頤頤夾口之筋也手三陽之筋結入於頤頤足陽明之筋上夾於口而風挾冷乘虛入其筋則筋攣故引牙關急而口噤也 薛前證若風邪客於手足陽明經口眼喎斜用秦

朮升麻湯

雜病中風

若風熱傷氣用省風湯

雜病中風

當與後方

同用 一婦人因怒經事淋瀝半月方竭遇怒其經即至甚則口噤筋攣鼻衄頭痛痰瘕搐搦瞳子上視此肝

火熾甚以小柴胡湯

傷寒少陽

加熟地山梔鉤藤治之後不

復發 一婦人素陰虛患遍身瘙痒誤服祛風之藥口

噤抽搐肝脈洪數余曰肝血為陰為水肝氣為陽為火

此乃肝經血虛火盛耳宜助陰血抑肝火用四物麥門

五味子柴胡山梔生甘草熱搐頓止又以八珍黃芪麥

門五味鉤藤炙草調理而愈

天南星散 治婦人中風口噤四肢拘急或痰氣上壅

天南星

薑汁炒黃

白附子

炮

黑附子

炮

烏蛇肉

酒炙

全蝎

炒等分

研為細末每服半錢以生薑汁溫酒調不

拘時拗開口灌之

走馬散

治婦人中風口噤四肢強直

附子

炮去皮臍

天

麻

各半兩

桂心

石膏

研如麴

麻黃

去節

川烏頭

炮去皮臍

天

南星

炮

蝎稍

各二錢半

麝

另研細錢半

研為細末入麝香研令

勻每服二錢豆淋酒調下不拘時幹開口灌之

烏蛇散

治婦人中風口噤

烏蛇肉

酒浸

乾蝎

炒

白殭

蠶

炒

天南星

炮

天麻

各半兩

膩粉

半錢另研

研為細

末入臙粉研勻每服二錢生薑酒調下幹開口灌之

白朮酒

治婦人中風口噤言語不得

白朮

剉黑豆

各三兩
炒熟

以黃酒四升煎至二升去滓分四服幹

開口灌之

治婦人中風口噤舌本縮語言難

芥子

一升

細研以

醋三升煎至一升塗頰頷下効

不語巢氏論曰脾脈絡胃夾咽連舌本散舌下心之別
脈系舌本今心脾二臟受風邪故舌強不得語也喉嚨

者氣之所以上下也會厭者音聲之戶舌者聲之機唇者聲之扇風寒客於會厭之間故卒然無音皆由風邪所傷故謂之中風失音不語經云醉臥當風使人發瘖不能言也 薛前證若因痰迷心竅當清心火若因濕痰舌強當清脾熱若因風熱牙關緊急當清肝火若因風痰塞喉當導痰涎若因虛火上炎當在水之主若因氣虛厥逆當益火之源若因腎虛舌瘖而不語當補腎氣 一婦人因怒仆地痰湧不語灌牛黃清心丸稍甦

用神仙解語湯加山梔柴胡桔梗漸愈又用六君柴胡
山梔枳殼而愈 一婦人忽然不語半年矣諸藥不應
兩尺浮數先用六味丸料加肉桂數劑稍愈乃以地黃
飲子二十餘劑而痊男子多有此證亦以此藥治之

諸方

並見雜
症中風

神仙解語丹 治心脾經受風言語謇澁舌強不轉涎

唾溢盛及療淫邪搏陰神內鬱塞心脈閉滯暴不能

言 白附子 炮 石菖蒲 去毛 遠志 去心甘草 天麻 全

水煮十沸

蝎

酒炒

羌活

白殭蠶

炒

南星

牛膽釀如無只煨各一兩

木香

半兩

右為細末水煮麴糊丸如梧桐子大量入辰砂為衣
每服二十九至三十丸生薄荷湯吞下無時

防風湯

治中風內虛脚弱語謇

石斛

一兩半酒炒

乾地

黃

杜仲

去粗皮切薑汁炒

丹參

各一兩二錢半

防風

川芎

麥門冬

去心

桂心

川獨活

各一兩

咬咀每服五

錢水一盞半棗二枚煎至八分去滓溫服

竹瀝湯

治中風入肝脾經年四肢不遂舌強語謇

歲靈仙

附子

炮

苦梗

蔓荊子

防風

枳殼

去穢
麤炒

川芎

當歸

各等分

為咬咀每服四錢水一

蓋竹瀝半盃薑三片煎至八分溫服一日四服忌茶
地黃飲子等方詳雜病本門

風痺手足不隨夫婦人風痺者由風寒濕三氣合而為
痺風多者為風痺其狀肌膚盡痛諸陽之經皆起於手
足而循行於身體風寒之氣客於肌膚始為痺復傷陽
經隨其虛處而停滯與血氣相搏血氣行則遲緩故風

痺而復手足不隨也 薛經云邪之所湊其氣必虛前
證若風邪淫旺或怒動肝火血燥筋攣用加味逍遙散
脾肺氣虛肌膚不仁手足麻木用三痺湯若腎水虧損
不能滋養筋骨或肝脾血虛而筋痿痺用六味丸服燥
藥而筋攣者用四物生甘草氣血俱虛用八珍湯何醫
林集要等方新刊丹溪心法附錄云若人大拇指麻木
不仁或手足少力或肌肉微掣三年內必有大風之證
宜先服八風湯天麻丸防風通聖散以預防之殊不知

河間云風者病之末也所以中風有癱瘓者非謂肝木之風內中亦非六淫之邪外襲良由五志過極心火熾盛腎水虛衰不能制之則陰虛陽實而熱氣怫鬱心神昏憤筋骨無用而卒倒無知也治當以固元氣為主若遽服八風等藥則反傷元氣適足以招風取中 一婦人因怒吐痰胸滿服二陳順氣化痰之劑半身不遂內熱口乾形氣殊倦余視之乃肝火熾盛而侮脾土也用逍遙散補中益氣湯六味地黃丸喜其慎疾年餘而愈

一婦婦胸脇脹痛內熱晡熱月經不調肢體痠麻不時吐痰或用清氣化痰藥喉間不利白帶腹脹又用清熱理氣藥胸膈不寬肢體時麻余曰此本鬱怒傷肝脾前藥傷甚耳朝用歸脾湯以解鬱結生脾氣夕用加味道遙散以生肝血清肝火百餘劑而愈後因怒肢體復麻用補中益氣加山梔茯苓半夏而痊後復怒病再作月經如注脈浮洪而數此肝火傷脾不能攝血所致也用六君芍歸炮薑一劑而血止用補中益氣加炮薑茯苓

半夏四劑而胃醒更用歸脾湯逍遙散調理而痊一
婦人頭暈吐痰用化痰理氣藥肢體或麻服祛風化痰
藥肢體常麻手足或冷或熱此脾土虛而不能生肺金
用補中益氣加茯苓半夏炮薑二十餘劑脾氣漸復諸
證稍愈更用加味逍遙散三十餘劑而愈後因怒吐痰
自服清氣化痰丸飲食不進吐痰甚多胸脇脹滿余用
六君子倍加參朮少加木香數劑而康

三痺湯 治血氣凝滯手足拘攣風痺氣痺等疾 川續斷 杜

仲

剉薑汁
炒去絲

防風

去蘆

桂心

華陰細辛

人參

去蘆

白

茯苓

去皮

當歸

去蘆

白芍藥

甘草

炙各一兩

秦朮

去蘆

生地

黃

川芎

川獨活

各半兩
去蘆

黃芪

去蘆

川牛膝

酒浸
各一

兩

為咬咀或為末每服八錢水二盞生薑五片

棗一枚煎至一盃去滓熱服無時候但腹稍空服有

人病左臂不隨後已痊平而手指不便無力試諸藥

不効服此藥一料而愈

獨活湯

治婦人風痺手足不隨身體疼痛言語謇澁

筋脈拘急並宜服之

獨活

去蘆

桑寄生

牛膝

酒浸

秦

朮

去蘆

赤茯苓

去皮

桂心

防風

去蘆

附子

炮去皮臍

當歸

炒去

蘆

生乾地黄

各一兩

杜仲

剉炒去絲

細辛

去苗

芎藭

赤芍

藥

各七錢半

甘草

炙半兩

為咬咀每服八錢水一中盞

半煎至一大盞去滓溫服無時

烏蛇散

治婦人風痺手足頑麻筋脈搖擗口眼不正

言語謇澁

烏蛇肉

酒拌炒

土蜂兒

炒

天南星

炮

天雄

炮去皮臍

赤箭

麻黃

去節

薏苡仁

芎藭

各一兩

羚羊角

屑

乾蝎

微炒

桑螵蛸

微炒

桂心

硃砂

研水飛各半兩

當歸

炒去蘆

酸棗仁

炒

栢子仁

各七錢半

研為細末入硃砂

藥研勻每服一錢食前溫酒調下

東垣羌活湯

治濕熱身重或眩暈麻木小便赤澀下

焦痿軟不能行履 羌活 防風 柴胡 各一錢 藁本

獨活 茯苓 澤瀉 豬苓 黃芪 炒 甘草 炙 陳

皮 黃蘗 酒炒 黃連 炒 蒼朮 升麻 川芎 各五分

右水煎服

甘草附子湯 治風濕相搏骨節煩疼不時抽痛不能

伸屈抑之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去

衣或微腫痛

甘草

炙一兩

附子

一枚重一兩三四錢者方是炮去皮尖不

真不効

白朮

炒一兩

桂枝

二兩

每一服五錢水煎

八珍湯

治肝脾氣血俱虛不能養筋以致筋攣骨痛

或不能行履或發熱晡熱往來等證

加味道遙散

治肝經風熱血燥筋攣肢體不遂內熱

晡熱等證

八珍方見雜病虛勞本方見本科調經

自汗藥隱老人云尋古治中風方續命排風越婢等悉能除去而千金多用麻黃令人不得慮虛凡以風邪不得汗則不能泄也然此治中風無汗者為宜若治自汗者更用麻黃則津液轉使脫泄反為大害中風自汗仲景雖處以桂枝湯至於不住發搐口眼瞤動遍身汗出者豈勝對治當此之時獨活湯續命煮散復榮衛却風邪不可闕也薛前證若腠理不固而自汗者用桂枝湯或防風白朮牡蠣湯若過服風藥而自汗者用白朮

防風湯若陽氣虛弱而自汗者用芪附湯若兼盜汗用補中益氣湯送六味丸如不應用當歸六黃湯

獨活湯 治風虛昏憤不自知覺手足痠癱坐卧不能或發

寒熱血虛不能服發汗藥及中風自汗尤宜服之 川

獨活 羌活 人參 防風 當歸 五味各去蘆 細辛

去苗 茯神 去木 半夏 湯洗七次切片子 桂心 白薇 遠志 去心

菖蒲 川芎 各半兩 甘草 七錢半炙 為咬咀每服八錢

水一盞半薑五片煎七分去滓溫服不拘時候

續命煮散 治風氣留滯心中昏憤四肢無力口眼喎
動有時搖擗亡失津液渴欲引飲此能扶榮衛去虛
風中風自汗及產後中風自汗尤宜服之 防風

獨活 當歸 人參 細辛 葛根 芍藥 川

芎 甘草 熟地黃 半夏 遠志 去心 荊芥穗 各半

兩 桂心 七錢半

為咬咀每服五錢水一杯生薑三

大片煎至七分去滓溫服不拘時汗多不止者加牡

蠣粉一分半

補遺防風白朮牡蠣散 治中風自汗不止 白朮

牡蠣

煨

防風

各等分

研為末酒調下米飲亦可日

三服汗即止如不止可服黃芪建中湯

賊風偏枯藥隱老人云偏枯者其狀半身不隨肌肉枯瘦骨間疼痛神智如常名曰偏枯也原其疾之由皆因陰陽偏虧臟腑怯弱經絡空虛血氣不足當風衝坐風邪乘虛而入內經云汗出偏沮使人偏枯詳其義理如樹木或有一邊津液不蔭注而先枯槁然後被風所害

人之身體或有一邊血氣不能榮養而先枯槁然後被風所苦其理顯然王子亨云舟行於水人處於風水能泛舟而亦能覆舟風能養體而亦能害體蓋謂船漏水入體漏風傷古人有云醫風先醫血血行風自滅是也治之先宜養血然後驅風無不愈者宜用大八風湯增損茵芋酒續斷湯 大賊風偏枯者是體偏虛受風風客於半身也人有勞傷血氣半身偏虛者風乘虛入客於半體名為偏風也其風邪入深真氣去邪氣留發為

偏枯此由血氣衰損為風所客令血氣不相周榮於肌故令偏枯也 薛醫風先醫血此論得之大抵此證多因胎前產後失於調養以致精血乾涸肝木枯槁治法當滋其化源考之生氣通天論曰風客淫氣精乃亡邪傷肝也陰陽應象大論曰風氣通於肝風搏則熱盛熱盛則水乾水乾則氣不榮故精乃亡此風病之所由作也 一婦人性善怒常自汗月經先期余以為肝火血熱不信乃汎用降火之劑反致月經過期復因勞怒口噤呻

吟肢體不遂六脈洪大面目赤色用八珍麥門五味子
山梔丹皮數劑漸愈兼用逍遙散六味丸各三十餘劑
全愈

大八風湯 治中風偏枯失音半身不遂時復恍惚

當歸

去蘆

杏仁

炒

甘草

炙

桂心

乾薑

炮

各二兩

五味子

升麻

各半兩

川烏頭

炮

黃芩

皮

芍藥

獨活

防風

各去蘆

川芎

麻黃

去節

秦朮

人參

各去蘆

石斛

去根切

茯苓

去木

石膏

去蘆

黃耆

去蘆

紫苑

各一兩

大豆

三兩

去皮炒

為咬咀每服五錢水二盞酒一合煎至一

盃去滓溫服恍惚者不用酒煎一方無茯神有遠

志赤茯苓

增損茵芋酒

治半身不遂肌肉乾燥漸漸細瘦或時

痛痛病名偏枯

茵芋葉

川烏頭

炮去皮尖

石楠葉

防風

川椒

炒出汗

女萎

附子

炮

北細辛

獨活

卷栢

肉桂

天雄

炮去皮

秦朮

防己

各一兩

躑

躑躅花

炒當歸

生乾地黄

各二兩

芍藥

一兩

為咬咀

酒二斗漬之冬七日夏三日春秋各五日初服一合
漸增之以知為度令酒氣相續

續斷湯

治偏枯少血

當歸

三兩去蘆

陳皮

去白

芍藥

細

辛

各一兩去苗

生乾地黄

二兩

為呬咀每服五錢水二

盞煎至八分去滓溫服臟寒多利者入熟附子一兩

和前藥服之

補遺全生虎骨散

治半身不遂肌肉乾瘦忌用麻黃

發汗恐津液枯竭唯當潤筋養血消風

當歸

二兩

赤

芍藥

續斷

酒浸炒

白朮

藁本

虎骨

炙各五兩

烏蛇

肉

炙半兩

研為末每服二錢酒調下骨痛加生地

一兩自利加天雄半兩

虎脰骨酒

治中風偏枯四肢不隨一切風痺筋脈攣

拳

石斛

石楠葉

防風

虎脰骨

炙

當歸

茵

芋葉

杜仲

酒炒牛膝

酒浸炒

續斷

酒浸炒

芎藭

巴戟

去心狗脊

去毛各一兩

以淨絹囊盛藥用酒一斗漬十

日每服一盞溫飲

偏風口喎 夫婦人偏風口喎者是體虛受風風入於夾口之筋也足陽明之筋上夾於口其筋偏虛風因虛而乘之使其筋偏急不調故令口喎僻也 薛一婦人懷抱鬱結筋攣骨痛喉間似有一核服烏藥順氣等藥口眼歪斜臂難伸舉痰涎愈多內熱晡熱食少體倦余以為鬱火傷脾血燥生風用加味歸脾湯二十劑形體漸健飲食漸進又用加味逍遙散十餘劑痰熱少退喉核少消更用升陽益胃湯數劑諸證漸愈但臂不能伸此

肝經血少而筋攣耳用六味地黃丸以滋腎水生肝血而愈

防風湯

治卒然口喎斜言語牽急

防風

去蘆一兩

羌活

去蘆半兩

甘草

二錢半炙

上為哎咀每服五錢水二盞煎

至一盞去滓入麝香研一字溫服

深師續命湯

療中風口僻噤諸疾卒死不知人補虛

起死神方

人參 防己

麻黃

去根節

芍藥

川芎

甘草

黃芩

白朮

各半兩

桂心

附子

炮

防風

各一

兩生薑

五兩

細切以水一斗二升煮取三升分為

三服不差更作忌海藻菰菜桃李葱生菜雀豬肉

防風散 治婦人中風言語謇澀肢節疼痛皮膚不仁

防風 羌活

各去蘆

當歸

去蘆炒

天南星

炮

天麻

桂

心 芎藭

烏蛇肉

酒浸

白殭蠶

炒

桑螵蛸

炒各半

麝

香

研

硃砂

細研化飛各二錢半

麻黃

七錢半去根節

共為細末入

研藥令勻每服一錢溫酒調下不拘時

千金方

炒大豆三升令焦以酒三升淋取汁頓服

治口眼喎斜 用草薺子七粒去皮研細作餅子安在

手心

右喎安左手
左喎安右手

却用銅盂乘湯坐於藥上纔正即

洗去

一用巴豆不用
草薺出本草

飛尸血厥

夫飛尸者遊走皮膚穿臟腑每發刺痛變作無常遁尸者附骨入肉攻鑿血脈每發不可得近見尸喪聞哀哭便發風尸者淫濯四肢不知痛之所在每發昏沈得風雪便作沈尸者纏骨結臟衝心脇每發絞切遇寒冷便

作注尸者舉身沈重精神錯亂常覺昏發每節氣至
變輒成大惡皆宜用忍冬葉剉數斛煮令濃取汁煎之
服如雞子大日三服

人平居無疾苦忽如死人身不動搖默默不知人目閉
不能開口噤不能言或微知人惡聞人聲但如眩冒移
時方寤此由汗過多血少氣併於血陽獨上而不下氣
壅塞而不行故身如死氣過血還陰陽復通故移時方
寤名曰鬱冒亦名血厥婦人多有之宜服白薇湯倉公散

丹溪云凡人忽手足逆冷肌膚起如米粒頭面青黑精

神恍惚或錯言妄語或牙關緊急或昏寐仆倒吊死問

喪入廟登墓多有此病先以蘓合香丸灌之次服調氣

散

雜病中氣

平胃散

雜病中食

玉機微義云卒厥飛尸客忤鬼擊

口噤用麻黃湯

傷寒太陽

寒厥表熱裏寒則下利清穀食入

則吐脈沈手足冷用四逆湯

傷寒厥

熱厥腹滿身重難轉

面垢譫語遺溺手足厥冷自汗脈沈滑用白虎湯

雜病發熱

錦衣楊永興舉家避者有僕沈醉失避者既而神思

昏寐遍身青傷各煎金銀藤

即忍冬葉

湯灌之愈

一婦人

忽昏憤發譫語自云為前謀賴某人銀兩某神責我將

你起解往城隍理問兩腳踝膝髻處皆青腫痛不可忍

口稱苦楚次日方甦痛尚不止用金銀藤兩許水煎服

即愈 一婦人入古墓患前證以紫金錠磨汁灌之即

甦通政余子華太常汪用之皆因往吊而卒死喪家想

即是證也

太乙神精丹

方見雜病譫妄

蘓合香丸

方見雜病卒中

雄硃散

方見

雜病
諸妄

白薇湯

白薇

當歸

各一兩

人參

半兩

甘草

二錢半

為呖

咀每服五錢水二盃煎至一盃溫服

倉公散

治卒鬼擊鬼疰鬼刺心腹如刺下血即死不

知人及卧魘齒脚趾不覺者并諸毒氣等疾 瓜蒂

末

九箬衛生方無瓜蒂末有皂角末

梨蘆末

雄黃

研

礬石

煅研各等

分

研為細末研停用少許吹入鼻中得嚏氣通

便活末嚏再吹以得嚏為度此藥能起死人恐皂角

者為正

補遺內鼻散

治尸厥脈動而無氣氣閉不通靜而若

死名卒厥

石菖蒲

去毛為末

上每用二字內鼻中吹

之令入仍以桂末安舌下

硫黃散

治尸厥奄然死去四肢厥冷不省人事腹中

氣走如雷鳴

焰硝

半兩硫黃

一兩

細研分三服酒調

灌下如人行五里又進一服

瘕瘕

薛醫藥綱目云瘰者筋脈急也瘰者筋脈緩也急則引而縮緩則縱而伸或縮或伸動而不止者名曰瘰瘰俗謂之發搐是也凡癲癇風瘰破傷風三證皆能瘰瘰但癲癇則仆地不省風瘰瘰瘰則角弓反張破傷風瘰瘰則有瘡口竊謂瘰者屬肝經風熱血燥或肝火妄動血傷瘰者屬肝經血氣不足或肝火汗多亡血以致手足伸縮不已抽搐不利若因風熱血燥用麝羊角散妊娠加鈞藤鈎山梔若肝火妄動用加味四物湯即四物加柴胡丹皮

山梔加釣藤鈎山梔若肝火血氣不足用八珍湯

即雜症虛勞門

湯八物

加釣藤鈎山梔若肝火亡血用加逍遙散

經調

加鈎藤

鈎山梔如不應須用六味丸

雜病虛勞

以補腎水生肝木為

主佐以前劑治之若其脈長弦者是肝之本脈則易治其脈短澁者是肺金尅肝木也則難治其面色青中見黑者是水生木也當自愈青中見白者是金尅木也必難愈 一婦人素口苦月經不調或寒熱妊娠五月兩臂或拘急或緩縱此肝火傷血所致也用四物加柴胡

山梔丹皮釣藤鈎而愈 一妊婦因怒寒熱頸項動掉
四肢抽搐此肝火血虛風熱用加味逍遙加釣藤鈎數
劑痊

顫振

黃帝曰人之顫者何氣使然歧伯曰胃氣不實則諸脈
虛諸脈虛則筋脈懈墮筋脈懈墮則行陰用力不復故
為顫因其所在補分肉間醫學綱目云顫振與瘈瘲相
類瘈瘲則手足牽引而或伸或屈顫振則但顫動而不

伸屈也胃虛有痰用參朮以補氣茯苓半夏以行痰如

實熱積滯用張子和三法 薛顛振者掉眩也易曰鼓

萬物者莫疾乎風鼓之為言動也大抵掉眩乃風木之

搖運也諸風掉眩皆屬於肝治法若肝木實熱用瀉青

丸

肝幼科

肝木虛熱用六味丸

肝雜病虛勞

肺金尅肝木用瀉白

散

肝雜病發熱

肝木虛弱用逍遙散

肝經調

加參朮釣藤鉤脾血虛

弱用六君子湯

肝雜病虛勞

加芎歸釣藤鉤胃氣虛弱用補中

益氣湯

肝雜病陽勞倦

加釣藤鉤若產後顛振乃氣血虧損虛

火益盛而生風也切不可以風為論必當大補斯無誤矣一婦人性善怒發熱經水非過期則不及肢體倦怠飲食少思而顫振余謂脾氣不足肝經血少而火盛也午前以調中益氣湯加茯苓貝母送六味丸午後以逍遙散送六味丸兩月餘而愈一婦人身顫振口妄言諸藥不効余以為鬱怒所致詢其故蓋為素嫌其夫而含怒久矣投以小柴胡湯

傷寒少陽

稍可又用加味歸脾

湯

歸脾湯加柴胡山梔

而愈

交加散 治瘰癧或顫振或產後不省人事口吐痰涎

當歸 荊芥穗 各等分 研為細末每服二錢水一

盞酒少許煎至七分灌下咽即有生理

增損柴胡湯 治產後或經適斷致手足牽搐咬牙昏

冒異證 柴胡 八錢 黃芪 炒五錢 黃芩 炒 石膏 各四錢 半夏

三錢 知母 甘草 炙各二錢 剉為粗末每服半兩薑五

片棗四枚水煎溫服

本事青鹽丸 治肝腎虛損腰膝無力顫振譫曳 懷

香末

三兩

兔絲子

四兩

乾山藥

二兩

青鹽

一兩

研

上先

將兔絲子洗淨無灰酒浸晒七日冬天近火煨炙乾另為細末和勻酒糊丸梧子大每服五七十九溫酒或鹽湯下常服壯筋力進飲食一婦人素患譫曳服此藥履地如故

本事星附散

治中風能言而手足譫曳脈虛浮而數

天南星

製同半夏

半夏

薄切片薑汁浸透

黑附子

炮

白附子

炮

川烏頭

炮

白殭蠶

炒

沒藥

人參

白茯苓

各等分

右為粗末每服二錢酒水各一盞同煎至八分去滓
熱進二三服汗出即瘥 在桐廬有患此證用前藥
三服得汗手足即能舉動

三因獨活散 治氣虛感風或驚恐相乘肝膽受邪使
上氣不守正位致頭招搖手足顫掉漸成目昏 獨

活 地骨皮 細辛 芎藭 菊花

甘味者

防風

去

甘草

炙等分

剉為粗末每服三錢水盞半煎至一

盞去滓煎取清汁六分入竹瀝少許再煎至一二沸

食後溫服日二服

世傳茯苓丸

治手臂抽牽或戰掉不能舉物服此藥

立愈又治脾氣虛弱痰邪相搏停伏中脘以致臂內

筋脈攣急而痛

茯苓半夏

薑製各二兩

枳殼

麸炒半兩

風

化朴硝

一兩

研為末薑汁糊丸桐子大每服二十

丸食後薑湯下

驚悸

失血心神不安

婦人血風驚悸者是風乘於心故也心藏神為諸臟之

主若血氣調和則心神安定若虛損則心神虛弱致風邪乘虛襲之故驚而悸動不定也其驚悸不止則變惚恍而憂懼也

排風湯亦可用

薛丹溪先生云驚悸者血虛用

硃砂安神丸痰迷心竅用定志丸怔忡者屬火屬痰思慮便動者屬虛時作時止者火動也假如病因驚而致驚則神出其舍痰乘而入矣蓋人之所主者心心之所養者血心血一虛神氣不守此驚悸之所由生也治當調養心血和平心氣而已金氏婦暑月赴筵因坐次失

序自愧成病言語失倫兩脈弦數予曰當補脾導痰清熱不信以數巫者噴水咒之而死或謂病既無邪以邪治之何至於死予曰暑月赴筵外受蒸熱辛辣適口內傷鬱熱而況舊有積痰加之愧悶其痰愈盛又驚以法尺益驚其神而氣血不寧噴以法水閉其肌膚而汗不得泄內燔則陰既銷而陽不能獨立不死何待故滑伯仁先生云若膽氣虛寒用茯神湯膽氣實熱用酸棗仁丸心氣虛熱用定志膏茯苓補心湯心氣實熱用硃砂

安神丸茯苓散 文學歸雲橋內人月事不及期忽崩

血昏憤發熱不寐或謂血熱妄行投以寒劑益甚或謂

胎成受傷投以止血亦不効余曰此脾氣虛弱無以統

攝故耳法當補脾而血自上用補中益氣湯

雜病傷勞倦

加

炮薑不數劑而驗惟終夜少寐驚悸別服八物湯不効

余曰雜矣乃與歸脾湯

雜病建志

加炮薑以補心脾遂如初

一婦人勞則心跳怔忡寒熱往來用歸脾湯為主佐

以八珍湯諸症漸愈又用加味逍遙散寧志丸而安後

復作服歸脾定志二藥即愈 一婦人患驚悸怔忡日
晡發熱月經過期飲食少思用八珍湯加遠志山藥酸
棗仁三十餘劑漸愈佐以歸脾湯全愈後因勞發熱食
少體倦用補中益氣湯又因怒適月經去血不止前證
復作先以加味道遙散熱退經止又用養心湯治之而
痊 一婦人驚悸怔忡無寐自汗盜汗飲食不甘怠惰
嗜卧用歸脾湯而愈至年餘懷抱鬱結患前證兼衄血
仍用前湯而愈

茯神散 治婦人血風五臟大虛驚悸安神定志 茯

神

去木

人參

去蘆

龍齒

另研

獨活

去蘆

酸棗仁

各一兩

防風

微炒

蘆

去心

遠志

去心

桂心

去苗

細辛

去苗

白朮

去蘆

甘草

炙

薑

炮各半兩

為咬咀每服五錢水一中盞半煎至一

大盃去滓溫服不拘時候

龍齒丸

治婦人血風上攻心神恍惚驚悸眠卧不安

龍齒

另研

茯神

去木

各一兩

硃砂

研水飛

人參

去蘆

當歸

去蘆

天

麻

各七錢半

檳榔

防風

去蘆

生乾地黃

犀角屑

各半兩

犀角屑

各半兩

遠志

去心

赤箭

各二錢半

麝香

一錢另研

研為細末煉蜜和

搗三五百下丸如梧桐子大每服三十丸薄荷湯送

下不拘時

朱貢琥珀散

治婦人血風驚悸

琥珀

研

沒藥

研

木

香當歸芍藥白芷羌活乾地黃延

胡索川芎

各半兩

土瓜根

牡丹皮

去心

白朮

桂

心各一兩

研為末每服一錢水一盃煎至七分入

酒一分再煎少時熱服重者數服効

茯苓補心湯

治心氣不足善悲愁怒衄血面黃五心

煩熱或咽喉痛舌本作強

茯苓

四兩桂心

甘草

炒

麥門冬

去心各三兩

紫石英

煨

人參

各一兩

大棗

二十枝

赤

小豆

二十粒

用河水七升煎二升半分三服

茯神湯

治膽氣虛冷頭痛目眩心神恐畏不能獨處

胸中煩悶

茯神

去木

酸棗仁

炒

黃芪

炒

柏子仁

炒

白

芍藥

炒

五味子

杵炒各一兩

桂心

熟地黃

自製

人參

甘草

炒各半兩

每服五錢薑水煎服

酸棗仁丸

治膽氣實熱不得睡卧神思不安驚悸怔

忡

茯神

去木

酸棗仁

炒

遠志

去心

栢子仁

炒

防風

各一兩

枳殼

剉炒

生地黄

半兩

青竹茹

二錢

五錢

研為末煉

蜜丸桐子大每服七八十丸白湯下

定志丸

治心神虛怯神思不安或語言鬼怪喜笑驚

悸

人參

茯苓

各一兩

五錢

菖蒲

遠志

去心各

一兩

為末蜜丸如前服

養心湯

治心血虛驚悸怔忡不寧或盜汗無寐發熱

煩躁

黃芪

炒

白茯苓

茯神

去木

半夏麴

當歸

酒拌

川芎

各半兩

辣桂

去皮

栢子仁

酸棗仁

炒

五味子

炒

人參

各三錢

甘草

炙四錢

每一服三五錢薑棗水煎

服

硃砂安神丸

治心經血虛頭暈心神驚悸等證

硃砂

飛過五錢

黃連

酒洗六錢

甘草

炙五錢

生地黃

當歸

各一

錢五分

研為末飯糊為丸每服十五丸如一二服

不應當服歸脾湯補之

治要茯苓散

治心經實熱口乾煩渴眠臥不安或心

神恍惚

茯神

麥門冬

各一兩半去心

通草

升麻

各一兩二

錢半

大棗

十二枚

紫苑

桂心

各七錢半

知母

一兩

赤石脂

一兩

七錢半

淡竹茹

五錢

每服一兩水煎

失血心神不安薛前證若脾肝鬱熱用加味道遙散脾

肝鬱結用加味歸脾湯脾胃虛弱氣血不足用八珍

湯十全大補湯脾肺虛弱氣血不足用補中益氣湯六

君子湯痰氣鬱滯用六君桔梗貝母如不應審係氣虛

但補脾胃如不應，用獨參湯如惡寒發熱，屬氣血俱虛。內熱晡熱，屬血虛作渴，面赤是血脫煩躁，皆宜甘苦之劑以補陽氣而生陰血。經云：血脫補氣。若用寒涼之劑以降火，則誤矣。仍審所屬之因治之。

寧志膏 治婦人因失血過多，心神不安，言語失常，不

得睡卧。辰砂研 酸棗仁炒 人參 白茯苓去木 琥珀

各一錢 分研 滴乳香一錢 研 研為末，和停，每服一錢，濃煎。

燈心棗湯 空心調下。

一方無茯苓琥珀蜜丸如彈子大，薄荷湯化下一丸。

茯苓補心湯

婦人以血旺氣衰為本心主血肝藏血

今血衰而氣盛者由心氣虛耗不能主血又不能制

乎肺金使肺金得以乘乎肝木肝之虧損則血不能

藏漸致枯涸不榮經絡故月事不調矣此方專補心

元之虛抑其肺氣之乘調和榮衛滋養血脈其疾自

然平復矣 即參蘓飲內除木香與四物湯對分勻

和以薑棗煎每服四錢食前溫服

參蘓飲

方見發熱

四物湯

方見通治

妙香散 治心氣不足精神恍惚虛煩少睡盜汗等證

甘草炒五錢 遠志去心炒 山藥薑汁炙 茯苓 茯神去木 黃

芪各一兩 人參 桔梗各五錢 辰砂另研三錢 木香二錢五分

右為細末每服二錢溫酒調下

半夏湯 治膽腑實熱精神恍惚寒熱泄瀉或寢汗憎

風善太息 半夏一錢五分 黃芩 遠志去骨各一錢 生地黃

二錢 秫米一合 酸棗仁炒三錢 縮砂仁一錢五分 共作一劑

長流水煎服

獨參湯

治元氣虛弱惡寒發熱或作煩渴躁痰喘氣

促或氣虛卒中不語口噤或痰涎上壅手足逆冷或
難產產後不省喘急用好人參二兩或三四兩加炮
薑五錢水煎徐徐服蓋人參性寒故以薑佐之如不
應急加附子

顛狂

大夫婦人顛狂病者由血氣虛受風邪所為也人稟陰
陽之氣而生而風邪入并於陰則為顛入并於陽則為

狂陰之與陽有虛有實隨其虛時為邪所并則發也顛者卒發意不樂直視仆地吐涎沫口喎目急手足撩戾無所覺知良久乃甦狂者少卧不飢自高賢也自辨智也自貴倨也妄笑好歌樂妄行不休故曰顛狂也素問云陽厥狂怒飲以鐵落狂怒出於肝經肝屬木鐵落金也以金制木之意予嘗治一女人眼見鬼物言語失常循衣直視衆醫多用心藥治之無効予投養正丹二貼煎乳香湯送下以三生飲佐之立愈又一男子亦曾

病此證亦用此藥收効且養正丹與百一方抱膽丸無異抱膽丸內無硫黃有乳香也 薛劉宗厚先生云有在母腹中受驚者或有聞犬驚而得者蓋驚則神不守舍舍空則痰涎歸之或飲食失節胃氣有傷痰停胸膈而作當尋火尋痰固元氣若頑痰膠固上膈必先用吐法若在腸胃亦須下之竊謂此證若因元氣虛弱或痰盛發熱等皆是虛象如慢驚證無風可祛無痰可逐但補脾胃生氣健旺神志自清痰涎自化若誤用辛散祛

逐腦麝之劑必為敗證 一婦人素清苦因驚而顛或
用風痰等藥愈甚余用參芪歸木濃煎佐以薑汁竹瀝
服三斤餘方愈

防風散 治婦人風邪顛狂或啼泣不止或歌笑無度

或心神恐懼或言語失常 防風 茯神去木 獨活

人參 遠志去心 龍齒研 菖蒲去毛 石膏 牡蠣各一兩

秦朮 禹餘糧 桂心各半兩 甘草七錢半 蛇蛻一尺炙

右為粗末每服三錢水一盞半煎七分去滓溫服

又方 羚羊角屑 人參 生乾地黄各七錢半 獨活 遠志

去心 菖蒲去毛 防風各半兩 茯神去木 石膏 麥門冬去心 龍

齒另研 白蘇皮各一兩 研為粗末 每服三錢 水煎溫

服無時

牛黃清心丸亦可用方見雜病中風

餘詳雜病本門

血風煩悶

大婦人血風煩悶者由腑臟勞傷血氣虛而風邪入之

搏於血脈使氣不通而否澀則生於熱或肢節煩疼口
乾少卧皆因虛弱而氣血壅滯故煩悶也 薛前證多
屬肝脾血虛發熱宜參照前寒熱方論主治

酸棗仁散

治婦人血風煩悶四肢疼痛心神多躁飲

食減少並皆治之

酸棗仁

赤芍藥

赤茯苓

去皮

當歸

去蘆

紅花子

生乾地黄

羚羊角

屑各七錢半

防

風

去義

羌活

去蘆

牛膝

酒浸

芫薺

桂心

地骨皮

麥

門冬

去心

甘草

各半兩炙

上為咬咀每服八錢水一中

薑半生薑七片薄荷七葉煎至一大盞去滓溫服不

拘時

紫石英散

治婦人血風煩悶心神恍惚睡卧不安

紫石英

兩

茯神

去木

麥門冬

去心

人參

去蘆

遠志

去心

酸棗

仁

當歸

去蘆

黃芩

各七錢半

羚羊角

屑

防風

去蘆

黃芪

各半

兩

甘草

炙二錢半

上為呔咀每服五錢水一中盞半

生薑五片棗二枚煎至一大盞去滓溫服不拘時

當歸散

治婦人血風潮熱

當歸

去蘆

芍藥

玄胡

索 熟地黄

各一兩

大黃

蒸七錢半

桂心

半兩

甘草

炙二錢半

右為細末每服一錢水一盞入乾胭脂一錢同煎至六分去滓食後溫服

赤芍藥散

治婦人氣血不和心胸煩悶不思飲食四

肢少力頭目昏眩身體疼痛 牡丹皮 白茯苓

赤芍藥 白芷

甘草

各二兩

柴胡

一兩半

研為細

末每服二錢水一盞生薑一片棗一枚同煎至七分

溫服食後臨卧

血風攻脾不能食

大脾屬於土脾為中州意智之臟也其肝心肺腎皆受脾之精氣以榮養焉脾與胃為表裏脾主化穀納食胃為水穀之海故經言四時皆以胃氣為本也婦人氣血不調臟腑勞損風邪冷氣蘊蓄在內攻於脾胃脾胃既虛為邪所乘則不能消任五穀故不能食也 薛經云胃乃脾之剛脾乃胃之柔傷胃則脾無所稟受傷脾則不能為胃運化是以脾胃為之表裏藉飲食以滋養百

脈者也竊謂前證若飲食所傷六君子湯

雜病虛勞

勞役所

傷補中益氣湯

雜病傷勞倦

若風寒所傷用人參理中湯

雜病

霍亂

木旺乘土六君加柴胡嘔吐腹痛或大便秘實前湯

加木香胸膈虛痞或肚腹不利六君子湯鬱怒傷損肝

脾歸脾湯

雜病健忘

命門火衰八味丸

雜病虛勞

仍審諸經錯雜

之邪而治之假如不能食而肌肉削乃脾胃經本病右關
脈緩而弱乃脾胃之本脈若見弦緊或四肢滿閉淋瀝
便難轉筋此肝之脾胃病也若兼洪大或肌熱煩熱面

赤此心之脾胃病也若兼浮澁或氣短喘急咳嗽痰盛
此肺之脾胃病也若兼沉細或善恐善欠此腎之脾胃
病也各當於本經藥中加兼證之藥此東垣先生之治
法也 一婦人停食飽悶或用人參養胃湯木香檳榔
丸而泄瀉吐痰腹中成塊又與二陳黃連厚朴反加腹
脹不食余以為脾胃氣虛不能消磨用補中益氣加茯
苓半夏五十餘劑脾胃健而諸症痊 一婦人飲食每
用碗許若稍加非大便不實必吞酸噯腐或用二陳黃

連枳實反加內熱作嘔余曰此末傳寒中不信仍作火
治虛證悉至月經不止余用六君加炮薑木香數劑諸
證漸退又以補中益氣加炮薑木香茯苓半夏數劑全
愈後因飲食勞倦兼以怒氣飲食頓少元氣頓怯仍用
前藥更加發熱脈洪大按之而虛兩尺如無此命門火衰
用補中益氣加薑桂及八味丸兼服兩月餘諸症尋愈
此症若因中氣虛弱用人參理中湯或六君子加木香
炮薑不應用左金丸

兩脇
脹痛

或越鞠丸

雜病
辨

虛寒加附子

理中湯

中寒

無有不愈

一婦人飲食後或腹脹或吞

酸自服枳朮丸飲食日少胸膈痞滿腿內酸痛畏見風寒或用養胃湯腿痛浮腫益盛月經不行余以為鬱結所傷脾虛濕熱下注侵晨用四君子芎歸二陳午後以前湯送越鞠丸諸證漸愈又方用歸脾八珍湯兼服兩月餘而經行一婦人胸滿少食或腹脹吞酸或經候不調此中氣虛而不能施化也用補中益氣加砂仁香附煨薑而飲食進更以六君芎歸貝母桔梗而經自調

一婦人年三十餘忽不進食日飲清茶水菓三年餘
矣余謂脾氣鬱結用歸脾加吳茱萸四劑遂飲食如常
若人脾腎虛而不飲食當以四神丸治之 一婦人不
進飲食二年矣日飲清茶菓品之類肝脾二脈弦浮按
之微而結滯余謂肝脾氣鬱用六君木香吳茱萸下痰積
甚多飲食頓進形體始瘦卧牀月餘仍服六君之類而
康

草豆蔻散

治婦人血風冷氣攻脾胃嘔逆不納飲食

草豆蔻

去皮

白茯苓

去皮

枇杷葉

炙

半夏

湯洗七次切

作片各七錢

半

高良薑

白朮

去蘆

縮砂仁

桂心

木香

青

骨皮

去白

甘草

炙半兩

人參

去蘆

一兩

為咬咀每服五錢

水一中盞半生薑七片煎至一大盞去滓溫服不拘

時候

訶梨勒散

治婦人血風氣攻脾胃腹脇妨悶四肢煩

疼或時痰逆不下飲食

訶梨勒皮

陳橘皮

各一兩去

白半夏

湯洗七次切片

人參

去蘆

桂心

白朮

去蘆

細辛

去苗土

當歸

炒去蘆

甘草

炙各半兩

藿香

赤茯苓

去皮

芎藭

各七錢半

右製煎服法同前

神麴丸

治婦人血風氣攻脾胃腹脇脹滿不思飲食

神麴

白朮

去蘆

附子

炮去皮臍

枳實

麸炒去穰

訶梨勒皮

桂心

食茱萸

木香

陳橘皮

去白

人參

去蘆

各一兩

桔梗

去蘆

乾薑

炮各半兩

研為細末酒煮麵糊和丸梧

桐子大每服三十九空心食前生薑湯下日進二

服

進食散 李潛云治脾胃虛寒不思飲食及久病人脾

胃虛全不入食者只兩服能食

陳云此方既有川烏治血風攻脾不食豈

無良驗

青皮 陳皮 粉草 桂心 良薑

各二錢半

烏頭

炮去皮尖

草豆蔻仁

各三枚

訶子

去核五枚

研為細末

每服一錢水一盞生薑三片煎七分溫服

身體骨節疼痛

大婦人血風身體骨節疼痛者由體虛氣血不調為風所侵故也其狀風邪在於皮膚肌肉歷於骨節邪氣與

正氣交擊故令疼痛也 薛東垣先生云飲食失節脾

胃虛弱乃血所生病故口中津液不行若火熱來乘土

位故肢體發熱作渴若肝經血熱用四物

雜病
虛勞

羌活黃

芩黃蘗肝經血虛用逍遙散

調經

山梔川芎風濕兼痰用

四物南星半夏羌活蒼朮風濕傷脾用羌活勝濕湯

雜病

腰痛暑濕傷氣用清燥湯

雜病
傷暑

氣鬱肝脾用四君木香枳

殼檳榔胃氣受傷用補中益氣湯

雜病
傷勞倦

瘀血流注用

四物桃仁紅花骨痛筋攣用當歸沒藥丸

本條

倦怠無力

用補中益氣羌活川芎 一婦人自汗盜汗發熱晡熱

體倦少食月經不調吐痰甚多二年後遍身作痛陰雨

益甚此氣虛而風寒所乘用小續命湯疼痛頓止又用

補中益氣加味歸脾三十餘劑諸證悉愈 一婦人月

經不調且素有痛風遇勞必作用衆手重按痛稍止此

血氣俱虛用十全大補雜病虛勞加獨活而痛痊用六味九

雜病虛勞逍遙散而經調 一婦人肢體作痛面色痿黃時

或赤白發熱惡寒吐瀉食少腹痛脇脹月經不時或如

崩漏或痰盛喘嗽頭目眩痛或五心煩熱口渴飲湯或健忘驚悸盜汗無寐等證卧牀年許悉屬肝脾虧損氣血不足所致用十全大補加味歸脾兼服月餘諸證悉痊

芎藭散

治婦人血風身體骨節疼痛心膈壅滯少思

飲食

川芎

一兩

赤茯苓

去皮

芍藥

酸棗仁

炒

桂心

當歸

去蘆

木香

牛膝

酒浸各七錢半

羌活

去蘆

枳殼

去穢炒

甘草

草

各半兩

上為咬咀每服三錢水一大盞半薑五

片煎至一大盞去滓熱服不拘時候

海桐皮散

治婦人血風身體骨節疼痛

海桐皮

桂心

白芷

當歸

去蘆

漏蘆

川芎

羚羊角

屑各一兩

赤芍藥

沒藥

另研

川大黃

炒

木香

檳榔

各半兩

研為細末每服二錢溫酒調下不拘

時

虎骨散

治婦人血風攻疰身體疼痛

虎脰骨

一兩半酥

炙麝香

二錢半另研

桂心

川芎

海桐皮

當歸

去蘆

牛膝

酒浸

天麻

附子

炮去
皮臍

骨碎補

沒藥

另
研

琥珀

另研
一兩

羌活

去
蘆

木香

各半
兩

研為細末入研藥令勻

每服二錢溫酒調下不拘時候日進二服

何首烏散

治婦人血風身體骨節疼痛或手足麻痺

腰髀沈重牽拽不隨並皆治之

何首烏

羌活

去
蘆

當歸

炒去
蘆

赤箭

附子

炮去
皮臍

桂心

赤芍藥

芎

薊

羚羊角屑

各七
錢半

葳靈仙

牛膝

酒浸
一兩

防風

半兩
去蘆

研為細末每服二錢豆淋酒調下不拘時

通靈丸 治男子婦人手足疼痛風走注痛不可忍

白附子

炮 殭蠶

炒各一兩

全蝎

半兩 炒

麝香

另研一字

研為

細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二三十丸溫酒送下日進三服不拘時

當歸沒藥丸 治婦人血風血氣腹脇刺痛筋攣骨痺

手足麻木皮膚瘙癢並皆服之

當歸

去蘆

五靈脂

炒各

一兩 沒藥

半兩 另研

研為細末醋糊和丸如梧桐子大

每服三十丸空心溫酒送下生薑湯亦可日進二

服

四生丸

治血風骨節疼痛舉臂不起行履艱難遍身

麻痺

白殭蠶

炒

地龍

去土

白附子

生

五靈脂

炒

草烏

頭

去皮尖生各等分

研為細末以米糊丸梧桐子大每

服二十丸溫酒送下或作末酒調半錢亦可日進二

服不拘時候

羚羊角散

治血風身體疼痛手足無力心神壅悶

羚羊角屑

酸棗仁

炒

生乾地黄

檳榔

各一兩

五

加皮 防風 赤芍藥 當歸 骨碎補炒去毛 海

桐皮

川芎

各七錢半

甘草

半兩

研為末每服二錢溫

酒調下

羌活勝濕湯

治頭痛脊痛腰似折項似拔 羌活

獨活

各一錢

藁本

防風

甘草

各半錢

蔓荊子

川

芎

各二分

用水煎服如身重腰沈沈然是濕熱也

加黃檗

一錢 附子

半錢 蒼朮

二錢

走疼痛

大夫婦人體虛受風邪之氣隨血而行或淫溢皮膚卒然掣痛遊走無有常處故名為走疰也加減小續命湯主之 薛東垣云若人身體沉重走疰疼痛此濕熱相搏或風熱鬱而不得伸附著於有形也是證多因飲食起居失節或因七情勞役失宜脾胃虧損腠理不密外邪所侵以致內熱晡熱自汗盜汗或經候不調飲食不

甘治法濕熱腫痛者清燥湯

雜病傷暑

兼痰佐以二陳湯

雜病

痰飲

肝火作痛者加味道遙散脾鬱作痛者加味歸脾湯

血虛作痛者四物湯氣虛作痛者四君子湯氣血俱虛者八珍湯俱加羌活川芎月經先期而痛者加味逍遙散頭眩倦怠而痛者補中益氣湯大抵按之痛甚者病氣實按之痛緩者元氣虛勞役而痛者亦元氣虛也飲食失宜而痛者脾氣虛也惱怒而痛者肝火盛也若晝輕而夜重者血分病也 一婦人歷節發熱作渴飲食少思月經過期其脈舉之洪大按之微細用附子八物湯四劑而痛止用加味道遙而元氣復用六味九而月

經調 一婦人體肥胖素有熱月經先期患痛風下體微腫痛甚則小便頻數身重脈緩此風濕血虛有熱用羌活勝濕湯二劑腫痛漸愈用清燥湯數劑小便漸清用加味道遙散內熱漸愈又為飲食停滯發熱仍痛面目浮腫用六君加柴胡升麻而愈又因怒氣小腹痞悶寒熱嘔吐用前藥加山梔木香而安惟小腹下墜似欲去後此脾氣下陷用補中益氣而愈後因勞役怒氣作嘔吐痰遍身腫痛經行寒熱此肝木侮脾土用六君加

柴胡山梔腫痛嘔吐悉退後用補中益氣而安 一婦
人飲食少思畏風寒患痛風嘔吐寒熱脈弦緊用附子
八物湯而四肢痛愈用獨活寄生湯而腰痛漸痊惟兩膝
腫痛用大防風湯而痛漸愈用歸脾逍遙而元氣復

沒藥散 治婦人血風走疰肢節疼痛發時來往不定

沒藥

另研

芎藭

當歸

炒去蘆

桂心

漏蘆

去蘆

木香

各半

兩白芷

琥珀

另研

地龍

去土微炒各七錢半

安息香

另研

麝香

另細研末各二錢半

為細末入研藥拌勻每服一錢溫酒

調下不拘時

琥珀散

治婦人血風走疰疼痛來往疼痛

琥珀

另研

當歸

去蘆

牛膝

酒浸

羌活

去蘆

川大黃

剉微炒各七錢半

桂心

一兩

沒藥

另研

乾漆

炒烟盡

玄胡索

防風

去蘆

羚羊角

屑各半兩

右為細末每服二錢溫酒調下不拘時日進二服

虎骨散

治婦人血風走疰疼痛不可忍

虎脰骨

二兩酥炙

乾蝎

炒

琥珀

另研各半兩

當歸

炒

威靈仙

牛膝

酒浸

羌活

去蘆

桂心

各一兩

漏蘆

去蘆

芎藭

沒藥

另研各七錢半

右為細末每服二錢溫酒調下不拘時候日進二服

雄黃散

治婦人血風走疰疼痛

雄黃

研水飛

血竭

另研

赤箭

側子

炮去皮臍

桂心

沒藥

另研

木香

白芥子

地龍

炒去土

蚘蛭

各半兩生用

麝香

二錢半另研

烏蛇

二兩酒浸去皮

骨炒微黃

研為細末入研藥更研令勻每服二錢熱

酒調下不拘時候日進二服

漏蘆散

治婦人血風走疰疼痛無有常處 漏蘆

當歸

牛膝

各三分

桂心

地龍

去土

防風

羌活

白芷

沒藥

研

甜瓜子

各半兩

虎脰骨

酥炙

敗龜板

醋炙

各一兩

研為細末每服二錢熱酒調下無時

四生丸

見前

麝香丸

治白虎歷節諸風疼痛遊走不定狀如蟲

齧晝靜夜劇及一切手足不測疼痛 大八角川烏

頭

三枚去皮尖生用

生全蝎

二十箇

生黑豆

二十粒

生地龍

去土

半兩

研為細末入麝香一字同研停糯米糊為丸

如菜豆大每服七丸甚者十九夜卧令鬲空溫酒吞

下微出冷汗一身便瘥許學士云予得此方凡是歷節及不測疼痛一二服便瘥在歙州日有一貴家婦人遍身走注疼痛至夜則發如蟲齧其肌多作鬼邪治予曰此正歷節病也三服效

芍藥知母湯

三因

治諸肢節疼痛身體魁癭脚腫如脫

頭眩短氣溫溫欲吐 桂心 知母 防風

各四兩

芍

藥 麻黃

去根節

甘草

各三兩

附子

二兩炮

為咬咀每

服四錢水一盞半生薑五片煎七分去滓空心服

一方有白朮川芎杏仁半夏

附子八物湯 治風歷節疼痛四肢如鉗鍛不可忍

附子 乾薑 芍藥 茯苓 人參 甘草 桂

心各三兩 白朮四兩 為咬咀每服四錢水二大盞煎

七分去滓食前服一方去桂用乾地黄二兩

獨活寄生湯

方見雜病腰痛

小續命湯 治白虎歷節痛不可忍

方見雜病中風

陳一婦人先自兩足踝骨痛不可忍次日流上於膝

三日流於髀骨甚疼至於肩肩流於肘肘流於後溪
或如鎚鍛或如蟲竄痛不可忍晝靜夜劇服諸藥無
効召僕診之六脈緊予曰此真歷節證也非解散之
藥不能愈但用小續命湯一劑而痊 又鄧安人夏
月亦病歷節痛不可忍諸藥無効召僕診之人迎與
心脈虛此因中暑而得合先服酒蒸黃連丸衆醫莫
不笑用此藥服一貼即愈自後與人良驗

治婦人血風走疰腰膝骨節疼痛不可忍 附子生薑

陸香 杏仁 研 桂心 當歸 芸薹子 芫花

巴豆 去皮各一兩 松脂 一兩半 研為細末 鎔黃蠟五兩

攪和諸藥 捏作片子 包裹痛處 立効

又方 芫花 桂心 各一兩 漢椒 二兩 桑根白皮 三兩 芸薹子

柳艸屑 各五兩 研為細末 用醋一升 拌和 蒸令熱

用青布裏熨痛處 冷即更入醋蒸用之

治婦人血風走疰 腰膝脚膝疼痛 天仙子 川烏頭

生附子 生各一兩 研為細末 以酒煎成膏 攤於帛上

數貼痛處多年者不過三上效



證治準繩卷五十九